


## Virtuelle Arbeit der Reaktionskräfte

Die virtuelle Arbeit der Reaktionskräfte verschwindet, da Reaktionskräfte orthogonal zu den freien Bewegungsrichtungen stehen (Orthogonalitätsbedingung). Im Folgenden sind Beispiele zur Berechnung der Reaktionskräfte  $\mathbf{f}^r$ , der virtuellen Verrückungen  $\delta\mathbf{r}$  und den jeweils geltenden Orthogonalitätsbedingungen für verschiedene mechanische Problemstellungen dargestellt.

### Beispiele für die Berechnung der virtuellen Arbeit der Reaktionskräfte ...


a) eines freien Punktes



$$\mathbf{f}^r = \mathbf{0}$$

$$\delta\mathbf{r} = \mathbf{e}_1\delta x_1 + \mathbf{e}_2\delta x_2 + \mathbf{e}_3\delta x_3$$

b) eines einfach gebundenen Punktes



$$\mathbf{f}^r = \mathbf{F} \cdot \mathbf{g}$$


$$\delta\mathbf{r} = \mathbf{J}_1\delta y_1 + \mathbf{J}_2\delta y_2$$

$$\mathbf{f}^r \cdot \delta\mathbf{r} = 0$$

$$\mathbf{J}_1^T \cdot \mathbf{F} = 0, \mathbf{J}_2^T \cdot \mathbf{F} = 0$$

(Orthogonalitätsbedingung)

c) eines zweifach gebundenen Punktes



$$\mathbf{f}^r = \mathbf{F}_1\mathbf{g}_1 + \mathbf{F}_2\mathbf{g}_2$$

$$\delta\mathbf{r} = \mathbf{J}\delta y$$


$$\mathbf{f}^r \cdot \delta\mathbf{r} = 0$$

$$\mathbf{J}^T \cdot \mathbf{F}_1 = 0, \mathbf{J}^T \cdot \mathbf{F}_2 = 0$$

(Orthogonalitätsbedingung)



d) eines statisch bestimmt gelagerten Punktes



$$\mathbf{f}^r = \mathbf{e}_1 g_1 + \mathbf{e}_2 g_2 + \mathbf{e}_3 g_3$$

$$\delta \mathbf{r} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{f}^r \cdot \delta \mathbf{r} = 0$$

(Orthogonalitätsbedingung)

## Literatur

- [1] W. Schiehlen, P. Eberhard. *Technische Dynamik*. Springer, Wiesbaden, 2017.